

Merkblatt über das Verhalten nach einem chirurgischen/implantologischen Eingriff

- Am Operationstag und ca. 2-3 Tage danach auf Genussmittel wie Alkohol, Zigaretten und Kaffee verzichten.
- Essen und Trinken erst nach Abklingen der Betäubung.
- Nur flüssige und weiche Nahrung zu sich nehmen.
- Auf Milch, Joghurt, Quark und sonstige Milchprodukte verzichten (ca. 1 Woche).
- Nicht im Operationsgebiet- bzw. Implantatbereich kauen.
- Es ist nicht ratsam, ein Kraftfahrzeug nach dem Eingriff selbst zu steuern.
- Den Operations- bzw. Implantatbereich weder mit den Fingern berühren, noch mit der Zunge an den Fäden spielen.
- Bitte die ersten Tage den Mund nicht ausspülen!
- Keine Munddusche oder elektrische Zahnbürste benutzen.
- Die Mundpflege im übrigen Mund- Kieferbereich wie gewohnt durchführen.
- Schwellungen im Operationsbereich und der Wange sind normal, sie klingen nach 3-4 Tagen ab.
- Durch Kühlen mit feuchten/kalten Umschlägen (2-3 Tage) lindern Sie die Schwellung.
- Falls Nachblutungen, stärkere Schmerzzustände oder sonstige Störungen Ihres Allgemeinbefindens auftreten sollten, benachrichtigen Sie uns umgehend.